

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百五十四

詳纂官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣何銓

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十四

明

周王朱橚撰

身體門

總論

凡人百骸四體肌肉皮膚關節脉絡總而謂之身風淫濕滯血刺痰攻皆能作痛至於骨之酸疼或熱入裏徹骨則倍蓰千萬大不侔焉蓋骨為髓之藏髓者飲食五味之實秀也髓虛勢所必至矣痛在於身風之証以走

注知之濕之証以重作驗之血有筋脉鑽刺之証痰有眩暈咳唾之証驅風除濕行血豁痰對証一投猶冀可以旦暮起病入於骨此勞極損傷之不可救藥者也然則身痛之與骨痛毫釐千里之差於此不可以無辨然醫家之辨多為項腫臂痛蓋熱在上焦不能清利則醞釀日久生痰涎聚飲氣流入於項臂之間不腫則痛耳然而曰痰曰涎曰飲又有理一分殊之別伏於包絡隨氣上浮客肺壅嗽而發動者痰也聚於脾元隨氣上溢

口角流出而不禁者涎也惟飲生於胃腑為嘔為吐此則胃家之病學者不可不知 身體胃膈隱熱隱疼拘急足冷此血之為病也以其飲酒嗜慾伏熱受暑得之惟熱毒暑酒毒為能傷血瘀血未去新血不榮身體所以隱痛拘急其裏熱足冷者血之証也用柴胡黃芩青皮枳殼靈脂桃仁木通甘草作劑多入大黃以利之俟其流利已盡小腹畧無結急即以當歸川芎一兩橘皮半夏枳殼桔梗木通甘草半之調其氣血於是有瘰

血屬於心木通通心心竅既通經絡之流行可知矣

胃脇痛引背上頭面兩手浮腫腎虛不能納氣歸元氣逆而上奔則胃膈滿痛以手摩挲痛走背上又從背摩挲則其氣循泄於後分而痛不作矣此氣之為病固也柰何腎虛又不能行水故隨氣奔上乘於肺頭面兩手浮腫氣短而喘由是血化為水與之俱沉滯其人舊來有風曰水曰血曰氣四者合而為病其痛非常如沉香木香烏藥檳榔之類好能施其巧治法將何如曰先以

二十四味流氣飲加獨活枳殼靈脂炒牽牛入薑蜜烏梅同煎嚥下養正丹二十粒雄黃升降水火引導大便次用桑皮紫蘇木通阿膠當歸桃仁青皮桔梗芫花大黃作劑依煎以薑蜜烏梅取盡大便黑物即收全功

肚皮疼腎虛不能得水加之酒麵無度後輒睡酒與水交聚於腹中而麵毒復纏滯其氣是以水滲於肚皮而作痛矣治法錢氏宣風散用蜜水煎嚥下神效俟其大便流行然後以青木香丸一分安腎丸倍之用二陳湯

入少鹽并生薑同煎空心嚥下脾腎氣復自然平安

胃膻氣膈有肺經伏熱而氣膈者有痰水在上而氣膈者大槩以茯苓半夏枳殼桔梗為治法其肺熱者如聖湯加桑白皮佐之心下水氣者小半夏茯苓湯効胃煩活人書用山梔子

身體疼痛

論

夫身體疼痛非濕則痰固也人有挾刀鋸之驚而又餒在其中為風寒水濕所傷致使心竅凝滯於是經絡壅

閉血不流行腸肉骨節為之刺痛治法當歸川芎芍藥
白芷靈脂大黃甘草利之黑物小片而不甚痛可瘳

方

治背痛方

出海上名方

治臂痛外連肌肉牽引背脾時發時止

用當歸二三兩切作薄片酒浸三日飲其酒酒盡別

換當歸浸服三兩日即愈

流氣飲子

出指南方

治臂痛外連肌肉牽引背脾時發時止此由

榮衛之氣循行失度流滯經絡與正氣相搏其發則

有似癰瘰

紫蘇葉 青皮 苦梗 當歸 芍藥 烏藥

茯苓

枳殼

去穰麩炒
一作枳實

黃耆

川芎

防風

各半兩

甘草

炙

橘皮

各三分

陳皮

大腹子

剉薑汁炒

木香

各二兩

右剉散每服水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去滓

服一方治腰臂痛發大黃橘皮

拈痛散

出御藥院方

當歸

去蘆頭

防風

去蘆頭

黑狗脊

骨碎補

並去毛

藥本

去去苗細辛

赤芍藥

自然銅醉淬桂皮去麁

草薢

以上各

一兩

右為麁末每二兩用手帕包定上用熱鹽包納在痛處熨之

枳殼煮散

出簡易方

治悲哀煩腦肝氣至兩腋骨疼筋脉拘

急腰脚滯重兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸致背攣急大治脇痛

防風川芎

細辛

枳殼

桔梗

各四錢

甘草

二錢

乾葛

錢半

右為粗末每服四錢水一盞薑三片煎七分空心服

白芥子散

出危氏方

治背痛外連肌肉牽引背脾時發時止

皆榮衛之氣循行失度流滯經絡與正氣相搏其發則似癰瘰

真白芥子

木鱉子

去皮各二兩

沒藥

桂心

木香

各半兩

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下

瓜蒌實丸

出濟生方

治胃痞胃中痛徹背脇喘急妨悶

瓜蒌實

別研

枳殼

去穰麩炒

半夏

湯炮七次

桔梗

去蘆頭各一兩

右為細末薑汁打糊丸如梧桐子大每服五十九食後用淡薑湯下

控涎丹

出危氏方

凡人忽患背手脚腰膝隱痛不可忍連筋

骨牽引釣痛坐卧不寧時走易不定俗醫不曉謂之走注便用風藥及針灸皆無益又是風毒結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下

變為此疾或令人頭痛不可舉或神意昏昏多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流涎涎手脚重腿冷痺氣脉不通誤認為癰瘡亦非也凡有此疾但以是藥不過數服其疾如失

甘遂

去心

紫大戟

去皮

白芥子

真者各等分

右為末煮糊丸如梧子大曬乾食後臨睡薑湯或熱水下五七丸至十九丸如疾猛氣實加丸數不妨其効如神 加味控涎丸一方見喘急類

治頭身無不痛顛倒煩滿欲死方

取頭垢如大豆大服之并囊貯大豆蒸熟逐痛處熨
作兩囊更番為佳若無蒸豆鼠壤土熨之亦可

治諸處皮膚裏面痛

右用何首烏為末生薑自然汁調成膏敷痛處以絹
帛裏之用火炙鞋底熨之神妙

虎骨酒法

出本草

治腎經疼痛不得屈伸走注痛苦不問

淺深

用虎脰骨新芍藥二兩以無灰酒浸春夏七日新月
二七日浸後須以銀石器盛於慢火上溫養三日兩
日即得服一方有黃羚羊角一大兩

貼藥羌花散

出經
驗良方

治臂腿間忽一兩點痛著骨不可

忍者

羌花根一把

右研為末米醋調隨大小傳之如痛不止以紙花覆
其上用綿帛扎定此方曾治一婦人產後而得此疾

者良驗

治臂痛

出經
良方

用桑枝細切一升炒香以水三升煎取二升日服數次

安

治手足煩疼

出肘
後方

用地膚子草三兩水四升煮二升半分作三服日一

劑一方取六七月者陰乾服

舒筋散

出直
指方

治風淫血刺身體疼痛四肢拘攣

延胡索

炒

辣桂

去

當歸

等分

右為末每二錢調酒下延胡索活血除風理氣

葛根湯

出千金方

治四肢緩弱身體疼痛不遂婦人產後中

柔風及氣滿方

葛根

芍藥

桂心

乾地黄

乾薑

各三兩

麻黃

甘草

各二兩

生薑

六兩

右八味以清酒三升水五升煮取三升溫服五合日

三

三皮散

出朱氏集驗方

治風毒濕氣流注脚膝四肢攣拳筋脉

不伸脚足疼痛步履難艱用此藥酒斷根不問三二

十年者皆有効

海洞皮

去皮

五加皮

新採者

桑白皮

川獨活

生乾

地黄

六升半

製杜仲

各一兩

黑附子

炮去皮斟酌多少

薏苡仁

生用川牛膝

一兩

右為粗末用綿裹作一色以無灰好酒一斗許春浸七日秋冬二七日夏三五日撈起藥空心溫服一盞

一日三五次服如服藥酒時却飲它酒常令酒氣相接勿令大醉重者不過兩劑服此藥後旬日兩腿必發大癰漸漸破出紫黑血候乾貼磨風膏脂瘡上自然好也日逐脚上如數百條蛇自足而出此其効驗如患足疾之人脚後有條筋直湊腎囊疼痛拘攣用妙香散一貼分作三二服空心食前溫酒鹽湯下自然伸也

拈痛散

出御藥院方

治肢節疼痛熨烙藥

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆

細辛

去苗

肉桂

去皮

防風

去蘆

白朮

川烏

生去皮臍

良薑

剉

麻黃

不去節

天麻

去苗

吳茱萸

生用

葛

根

乳香

另研

川椒

去子并閉口者

全蝎

生用

當歸

各一兩去苗

川

薑

生用半兩

右為麤末入乳香勻炒一十錢痛甚者加至十五錢

同細鹽一處炒令極熱用絹袋內貯藥熨烙痛處不

拘早晚頻用為効如藥冷即再炒一次用畢其妙藥

不用

薏苡仁散

治濕傷腎不養肝肝自生風遂成風濕流

注四肢筋骨或入左肩髃肌肉疼痛漸入左指中

薏苡仁

一兩 當歸

酒浸 人參

川芎

白朮

羌活

川烏

炮去皮臍

桂心

防風

去蘆

茵芋

炒

麻黃

去節

乾薑

炮獨活

甘草

炙各半兩

右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服

徐神翁神効地仙丹

治筋骨疼痛打撲傷損仙術湯

送下除寒濕進飲食神効

川烏

一個
炮製

草烏

五個
炮製

白芥

去根
半兩

蒼朮

半兩
米泔
浸一宿炒

白

芷

半兩

自然銅

一研

地龍

沒藥

各半
兩研

乳香

半錢
研

蒿

苴種

黃瓜種

稍瓜種

木鼈子

各一錢

半兩錢

文二

右為末醋糊丸如桐子大每服十九食後溫酒送下

虎骨丸

治經絡凝澁骨節疼痛筋脉攣急遇陰寒愈

痛

南乳香

別研

沒藥

另研

赤芍藥

熟地黃

虎脰骨

酥炙

黃
當歸各一兩 血竭五錢

右為細末用木瓜一枚切破去子入乳香在內以麻
縷紮勿令透氣好酒二升煮至酒盡取木瓜去皮研
如泥更入熟蜜少許杵和為丸如桐子大每服三十
丸至五十九病在上食後在下食前溫酒下

治骨節疼痛煩不得屈伸近之則痛短氣得汗出或欲
腫者

桂
木四兩 甘草二兩

右用水六升煮取三升分三服汗出愈

治卒得胸痛癢而復發者

取薤根五觔搗絞汁飲之立止

加減當歸飲子 治肩忽疼

防風 當歸 柴胡 生地黄 大黃

各一兩半

芍藥

人參 黃芩 甘草

各一兩

二錢

黃連

五錢

滑石

六兩

右為散以白水煎服無時

活絡湯 治風濕臂痛諸藥不効者此方專主之

白朮

薄切

一兩當歸

淨洗薄切乾秤

羌活

淨洗去蘆切焙

獨活

淨洗

甘草

炙

川芎

各半兩

右剉散每服三大錢水一盞半薑五片慢火煎至一盞去滓溫服並滓不拘時候一方用蒼朮切炒川白芷各二兩為末每服二錢酒調

趁痛丸 治腰臂痛

五靈脂

赤芍藥

各半兩

川烏

一個

沒藥

四錢

麝香

一錢

右為末酒糊丸空心溫酒送下

葉氏方十味剉散 治中風血弱臂痛連筋及骨舉動

難艱此藥亦補心益血氣養筋生力

附子

三兩炮
去臍皮

當歸

去土
洗切

黃耆

炙

白芍藥

各二兩

川芎

不見火

防風

去蘆

白朮

各一兩半

肉桂

去麝皮一兩
而不見火

茯苓

熟

地黃

洗淨用少酒熬乾
焙之各七錢半

右修製了再稱咬咀每四錢水一大盞薑八片棗三枚擘開煎七分去滓通口服食後臨睡日三服溫覆厚衣將養一方去黃耆熟地黃用當歸去蘆淨洗乾焙白

芍藥川芎白朮人參附子白茯苓桂心川獨活防風
甘草細剉每三錢薑八片水一盞半煎八分去滓食
前服除寒邪益血氣名川獨活湯製地黃法須洗淨
以好酒浸令乾焙之

五靈脂散 治臂脾痛

五靈脂 荊芥穗 防風 羌活 獨活 甘草

節 穿山甲 骨碎補 草烏

各五錢 麝少許

右為末用溫酒調下臨睡服如渾身損痛加沒藥木

香酒調下空心

芎活湯 治水飲停蓄注於脾脉發為臂痛皆因脾土

有虧平日多飲水漿不能傳化所致

川芎

半夏

湯洗

白茯苓

獨活

陳皮

枳殼

去穢

炒各半兩

白朮

甘草

各一分

右為散每服三錢水一盞半生薑五片同煎去滓食

後少停溫服

舒經湯

一名五痺湯
出瘡療方

治臂痛不能舉有人常苦左臂痛

或以為飲或以為風為溫諸藥悉投繼以針艾俱不
効得此方而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風
飲非濕腰以下食前服腰以上食後服

片子薑黃

四兩無則用
嫩莪朮代

甘草

一兩
炙

羌活

一兩

海桐皮

去麤
皮

當歸

赤芍藥

白朮

各二
兩

右咬咀每服三錢水一鍾半生薑三片磨沉香少
許同煎服之陳氏經驗方云沈自聞嘗苦此臂痛或
以為飲或以為風濕諸藥悉投繼以針艾俱不効一

日見陳君卿云亦常患此德清尉傳一方云可三服而愈蓋是血氣留滯經絡不行所致非風非飲非濕非氣但其方只前四味止能治腰以上疾若腰以下則不及也後見王伯舉因話及此伯舉云吾有方謂之五痺湯又添後三味腰以下疾則食前服腰以上疾食後服一名白朮薑湯

獨活湯 治病人脊背相引而痛者此為衛不和也

獨活

四兩

葛根

桂枝

芍藥

防風

甘草

乾

薑各二兩

右件咬咀以水一斗先煮葛根減三升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升覆取微汗似若病止宜消散者服湯則無汗而解若咽痛而渴加括萎二兩或欬或嘔者加半夏二兩惡熱藥者去乾薑面赤斷痛者加鷄蘇二兩水增二升

治皮肉痒痛

用酒二升水五升茱萸子半升煎取三升去滓微暖

洗立止

治關節疼痛

蒲黃

八兩附子一兩
炮

右為末服一錢匕日三稍增至方寸匕

茯苓丸

出仁
存方

若臂痛不能舉手或左或右時復輪移由

伏痰在中內腕氣滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬
脾滯而氣不下上行攻臂其脉沉細者是後人謂此
臂痛乃痰證也作痰治無不効者

白茯苓

兩半夏

二枳實

一作枳殼

風化朴硝

各半兩

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大每服三十九丸薑湯下食後服累有人為痰所苦夜間兩臂常若有人抽撻兩手戰灼至於茶盞亦不能舉只以此藥治之皆隨服隨愈世間所謂痰藥未有如此之神妙也

調氣丸

出指南方

牽牛末

一兩

陳皮

半兩

青皮

一分

右為細末麵糊丸如桐子大每服十九丸薑湯下

理氣湯

出指南方

半夏

五兩橘皮

四兩官桂

三兩人參

二兩甘草

一兩

右為麤末服五錢水三盞薑十片煎一盞去滓服

栢子仁丸

出指南方

栢子仁

炒

黃耆

茯苓

楮實

五味子

覆盆

子附子

石斛

鹿茸

炙去毛

酸棗仁

枳實

官桂

沉香

地黃

等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九米飲下

天麻除濕湯

一名白朮散出楊氏家藏方

治濕留肢節身體煩疼手

足腫痛或時麻木

白朮

四兩

天麻

三兩

人參

去蘆頭

乾薑

二兩

全蠍

二兩用糯米一

盞炒黃色去糯米不用

附子

生去皮臍切開取生薑自然汁一盞浸一宿取出炙盡元浸薑

汁為度薄切秤二兩

右件為細末每服三錢空心溫酒調下食前

天仙散

出楊氏家藏方

治遍身麻木腰脚疼痛節急骨疼

天仙子

草烏頭

生去

蛇床子

杜鵑

煨

乾薑

炮

上五味

各半兩

右件咬咀平分作兩次每用水五升煎五七沸淋漆以被蓋之汗出是驗

臂痛多曰風其脉濡而來反急明其濕用

出永類
鈴方

蒼朮

附子

各等分

木香

一分

薑煎帛蓋屋上露星一宿次日重湯煖服愈

麻黃湯煎

出東垣
試効方

治陰濕中汗出懶語四肢困倦無力

走注疼痛乃下焦伏火而不得伸浮而躁熱汗出一

身盡痛蓋氣濕相搏也以升陽發汗漸漸發之在經者亦宜發汗如正值季春之月脉緩而遲尤宜發汗令風濕去而陽升以此困倦乃退氣血俱得生旺也

麻黃

二錢去節微研不令作沫水五大盞煎令沸去沫煎至三盞入下項藥再煎

黃耆

白朮

半錢人參

半錢

甘草

三錢

羌活

一錢

柴胡根

半錢

防風

半錢

杏仁

三個去皮

黃芩

一錢

生地黄

半錢

一方無白朮人參甘草羌活

右剉如麻豆大都作一服入麻黃湯煎至一盞臨卧

服之勿令食飽取漸次有汗則効

治背氣發作攻背并兩臂兩脇忽攻腰坐卧不安

出護命方

枳殼

二兩
去穢

巴莖

半兩
去
皮膜

右件於鐺內熬炒令香熟去巴莖不使却入沉香甘草各一分同杵為末空心葱湯調下半錢不轉第二度加服一錢

治一切男子女人忽然身體勞倦四肢百節疼痛大腑

秘熱小便黃赤

出護命方

升麻 山梔 黃芩 麥門冬 去心 柴胡 去心 牡丹皮

去心 貝母 去心 虎杖 山茵陳 木香 大黃 杏仁

麻黃 去根各一兩

右為細末每服二錢水一盞煎一服後卧和滓徐熱

喫

沉香鱉甲散 出直指方 治勞倦身痛

沉香 人參 牛膝 茯苓 秦艽 木香 黃

耆 微炙 熟附子 辣桂 去麋皮 鱉甲 浸去裙襴醋炙黃各一兩 柴

胡荊芥各半巴戟去心當歸半夏製羌活熟

地黃

洗酒煎蒸
七錢半

全蝎

三錢半

大肉豆蔻

四箇

右為末每二錢葱白二寸薑三片棗二枚食前煎服溫

酒調下尤妙

治渾身走注疼痛及顛撲閃肭痛

出衛生
家寶方

每用晚蠶沙一升分二處每用鹽二兩各炒熟右用

絹帛包熨痛處冷即易之

昔楊惜患背腫馬嗣明以煉石塗之便差煉石法以麝

黃色石如鵝鴨卵大猛火燒令赤內醇醋中自有石屑落頻燒至石盡取屑曝乾搗篩醋和塗腫上無不愈

出瘡

療方

治氣滯風壅手臂脚膝痛

出本草

以醋糟裏之兩易當差

百一選方云治臂腿之間忽一兩點痛著骨不可忍者
芫花根一味研為細末米醋調隨大小傅之立止廬
州郭醫云此是陶成一醫者方曾治一婦人產後而

得此疾者良驗但敷貼不住須以紙花覆其上用絹綿繫定也

治身體手足腫

出本草

驢脂和鹽傅之

治臂腕痛

出本草

取死蝮蛇一條以水煮取濃汁浸腫冷痛易之

治四肢疼痛

出本草

用山龍膽草根細剉用生薑自然汁浸一宿去其性

烘乾搗水煎一盞許溫服之

治身體手足腫卒大

出本草

用醋和蚯蚓屎傅之

治身脚酸疼兼微腫

出本草

治身體手足卒痛腫

出本草

用搗蒼耳傅之立効春用心冬用子

又方以烏麻五升熬碎之酒一升浸一宿隨多少飲之

腰痛

附論

凡腰痛有五。一曰少陰。少陰腎也。十月萬物陽氣皆衰。是以腰痛。二曰風痺。風寒著腰。是以腰痛。三曰腎虛。役用傷腎。是以腰痛。四曰腎腰墜墜傷腰。是以腰痛。五曰取寒服地氣所傷。是以腰痛。痛不止。引牽腰脊皆痛。大抵腰痛之脉皆沉弦而緊者。寒弦而浮者。風沉弦而濡者。濕又有墜墜閃肭氣血凝滯而痛者。脉多沉弦而實。蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊。腎氣一虛。凡衝風受濕。傷冷蓄熱。血滲氣滯。水積墜傷。與夫失志作勞種種。

腰疼疊見而層出矣衝風者汗出乘風風邪風毒之胫胎也受濕者踐雨卧濕重著腫滯之萌蘖也腰間如水為傷冷發渴便閉為蓄熱血滲則轉側如錐之所刺氣滯則鬱悶悶而不伸積水沉重則小腸不得宣通墜損傷則瘀血為之凝結閃挫失志者腎之戕舉是數證腎家之感受如此腰安得而不為痛乎內經曰腰者腎之府轉搖不能卧將憊矣審如是則痛在少陰必究其受病之源而處之為得然宗筋聚於陰器肝者腎之同系

也五臟皆取氣於穀脾者腎之倉廩也鬱怒傷肝則諸筋縱弛憂思傷脾則胃氣不行二者又能為腰痛之冠太陽腰痛引項脊骨如重狀陽明腰痛不可以顧則如有所見善悲少陽腰痛如針刺其皮循循然不可俛仰不可以顧太陰腰痛煩熱腰下如有橫木居其中甚則羸瘦少陰腰痛引脊內厥陰腰痛中強弩弦狀此舉六經以為外因治備大抵太陽少陰多中寒少陽厥陰多中風熱太陰陽明多燥濕以數推之當隨脉別

其如經中有解脉散脉同陰會陰陽維衡絡直陽飛陽
肉里尻交等穴皆不出六經流注但別行各有所主不
欲繁引請尋內經刺腰痛論以備明之准此從所因汗
不施治失志傷腎鬱怒傷肝憂思傷脾皆致腰痛者以
肝腎同系脾胃表裏脾滯胃閉最致腰痛其證虛羸不
足面目黧黑遠行久立不能盡失志所為也腹急脇脹
目視眊所祈不得意淫於外宗筋弛縱及為白淫鬱怒
所為也肌肉削弱痺而不仁飲食不化腸胃脹滿閉墜

腰脇憂思所為也。准此從內所因調理。施治腎著腰冷如
水。身重不渴。小便自利。食飲如故。腰以下冷重如帶
五千錢。因作勞汗出。身衣裏冷濕。久久得之。腎

公對切腰

痛者。偃僂腫重。引季脇痛。因於墜墮。惡血流滯。及房勞
疲力耗竭。精氣致腰疼痛。准此從不內外因補瀉。施治
夫腰痛者。屬乎腎也。多因勞後傷腎。臟氣空。風寒冷
濕。得以襲之。鬱怒憂思。得以傷之。皆致腰痛。但墜墮閃
肭。血氣凝滯而痛者。未有藥也。葢靈仙九主之。今人每

患腰痛不問空實多進牽牛之藥殊不知牽牛之為性能傷腎氣服之未見作効腎氣先有虧損矣倘的是氣滯腰痛進三服則可如服之不効用橘核入鹽炒浸酒放溫送下小七香丸最佳頭看不上面自有奇功萬一

腎虛腰痛牽牛豈宜服也謹之謹之

一男子六十餘病腰尻脊膝皆痛數

載不愈晝靜夜躁大痛往來屢求自盡天且夕其痛作必令人以手捶擊至五更鷄鳴則漸減向曙則痛止左右主病者皆作鬼神陰譴白虎鬻朝禱暮祝覲巫僧道禁師至則其痛以減又夢鬼神戰鬪相擊山川神廟無不祭者淹延歲月肉瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候一死有書生曰既云鬼神虎鬻陰譴之禍如此禱祈何

無一應聞陳郡有張戴人精於醫可以問其鬼神白虎
與病乎彼若術窮可以委命其家從之戴人診其兩手
脉皆沉滯堅勁力如張絙謂之曰病雖瘦難於食然腰
尻脊胯皆痛者必大便堅燥其左右曰有五七日或八
九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬不可言必令人刺取
之墮下一兩塊渾身燥痒皮膚渴破枯澁如髮片戴人
既得病之虛實陰用大承氣湯以薑棗煎之加牽牛頭
末三錢不敢書是瀉劑蓋病者聞煖則悅聞寒則懼說
補則從說瀉則逆此蔽非一日也及煎成使稍熱咽之
從少至多累至三日天且晚臟腑下泄四五行約半盆
以燈視之皆燥糞碎塊及瘀血雜腥穢不可近須臾痛
減九分昏睡鼻息如常睡至明日將夕覺飢而索粥食
溫涼與之又困睡一二日其痛盡去次令飲食調養日
服導引丸甘露散滑利便溺之藥四十餘日乃復靈樞
經謂刺與病雖久猶可拔而雪結與閉雖久猶可解而
決夫腰脊胯痛者足太陽膀胱經也胯痛足少陽膽經

之所過也難經曰諸痛為膏內經曰諸痛痺瘡疾皆屬火注曰心寂則痛微心燥則痛甚人見巫覡僧道禁師至則病稍去者心寂也然去其後來者終不去其本也古之稱痛隨利減不利則痛何由去病者既痊壽至八十歲故凡燥證皆三陽病也北人衛德新因之析津冬月飲寒致冷病腰常直不能屈伸兩足沉重難於行步塗中以床舁遞程程問醫皆云背虛凡從容巴戟附子鹿茸皆用之大便反秘潮熱上膈將經歲矣乃求拯於戴人曰此疾十日可取效衛曰效則不慮遲戴人曰是太陽經血多病則腰似折膈如結脇如裂太陽所至為屈伸不利况腰者腎之府也身中之大關節今既強直而不和利宜鹹以熨之數服則和柔矣難經曰強力入房則腎傷而髓枯竭胃乃壞而不用與此正同今君之證太陽為寒所遏血隧下滯腰間當必有積血非腎也節次用藥利數十行約去血一二十次以四面玲瓏毫蒸之汗出三五次而愈初蒸時至五日問曰腹中鳴否

德新曰未也至六日覺鳴七日而起已能揖人戴人曰
病有熱者勿蒸蒸則損人目也今子病腰腎久衰視聽
半失此陰氣乘陽而上氣短精神不足且肺弦皆陽氣
衰弱伏匿於陰中故爾癸卯歲六七月間因兩陰寒踰
月不止時人多病泄利乃濕多成五泄故也一日體重
肢節疼痛大便泄併下者三而小便閉塞黝黑內經云
在下者引而瀉之是先利小便也又云諸瀉而小便不
利先分利又云治濕不利小便非其治也皆當利其小
便必用淡滲之劑以利之下其法也今客邪寒濕之勝
自外入裏而甚暴若以淡滲之劑以舒之病雖即已是
降之又降復益其陰而重竭其陽也則陽氣愈削而精
神愈短矣陰重強而陽重衰也茲以升陽之藥是為宜
爾羌活獨活升麻各一錢防風炙甘草各半兩同咀咀
水三盞煎至一盞去滓熱服一服乃愈夫經云寒濕之
勝助風以平之又曰下者舉之此得陽之升勝故愈也
是因曲為直也夫聖人之法可以類推舉一則可以知

百
矣

方

專治腰疼方

香白芷

紅麴

各二錢半

右為末空心溫酒調服

麻子方 治風水腹大臍腰重痛不可轉動

用冬麻子半升碎水研濾取汁米二合以麻子汁煮作稀粥著蔥椒薑豉空心食之

草薺湯 治腰痛動轉難艱似有氣注

草薺

一兩半

當歸

一兩切焙

桔梗

一兩半炒

牡丹皮

一兩

黃連

去鬚

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒十枚

附子

炮裂去皮臍二兩

代赭

一兩半

桑

白皮

剉炒一兩半

貫衆

一兩

大腹皮

一兩半

桂

去麤皮

白茯苓

去黑皮

覆盆子

去梗

黃芩

去黑心各一兩

吳茱萸

先焙炒

草豆

菟

去皮一枚

桃仁

湯去皮尖雙仁十枚

蛇床子

炒一兩半

乾薑

炮半兩

大

瓜

去皮子焙乾一兩

右剉如麻豆大每五錢匕水一盞半煎一盞去滓空

心溫服

杜仲酒

出聖惠方

治腎脉逆小於寸口膀胱虛寒腰痛胸中動

通四時用之方通治五種腰疼

杜仲

乾薑

各四兩一云乾地黄

萆薢

羌活

天雄

蜀

椒

桂心

芎藭

防風

秦艽

烏頭

細心

各半兩

五加皮

石斛

各五兩

桔薑根

地骨皮

續

斷

桔梗

甘草

各一兩

右咬咀以酒四斗浸四宿初服五合加至七八合日

再通治五種腰痛

獨活寄生湯

出和利方

夫腰痛皆由腎氣虛弱卧冷濕地當

風所得不得過治善流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼

重或腰痛攣脚重痺弱或皮肉紫破有瘡者宜服之

秦艽

去土

茯苓

去皮

白芍藥

桂心

不見火

杜仲

裂炒斷絲

桑

寄生

錄驗用續斷無寄生

細辛

去苗土洗

牛膝

酒浸去蘆

防風

去蘆各二兩

甘草

各半兩

人參

熟地黃

當歸

各二兩

獨活

三兩

右為散每服四大錢水二盞煎七分去滓空心服氣

虛不利或中脘不快者除地黄加生薑婦人新產腹痛不得動轉及腰脚攣痛痺弱不得屈伸此湯最除風消血肘後有附子一枚無寄生人參甘草當歸近人將治歷節風并脚氣流注甚効一方有生薑煎服湯取蒴藿葉火燎厚安席上及熱眠上冷復燎之冬月取根春取莖燎火卧之佳其餘薄熨不及蒴藿蒸為愈也諸處風濕亦用此法

獨活湯

出試効方

治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活 防風 獨活 肉桂 煨大黃 澤瀉

各三

錢桃仁

五個

當歸稍

連翹

各半兩

甘草

炙二錢

防己

黃連

各一兩一方用黃蘗酒製無黃連

右咬咀每服半兩酒半盞水一盞半同煎去滓熱服

立愈

巴戟丸

治諸腰痛或腎虛冷腰疼痛陰痿

乾漆

熬煙絕

巴戟天

去心

杜仲

牛膝

各十二分

桂心

狗

脊

獨活

各八分

五加皮

山茱萸

乾薯蕷

各十分

防風

分六

附子

分四

右煉蜜為丸如梧桐子大空心腹酒下二十九再加

減以止為度

調肝散

出直指方

治鬱怒傷肝發為腰痛

半夏

製三

辣桂

宣木瓜

當歸

川芎

牛膝

好細辛

各二分

石菖蒲

酸棗仁

湯浸去皮微炒

甘草

炙各一分

右剉細每三錢薑五片棗二枚煎服

牛膝丸

牛膝酒浸 草薢 杜仲剉炒 茯苓酒浸 兔絲子 防風

葫蘆巴炒 桂減半 破故紙 沙苑白蒺藜等分

右為末酒煮猪腰子為丸每服五七十九空心溫酒下如腰痛不起者服甚効

神應膏藥 治貼腰痛

川烏 馬蘭子 官桂 乾薑 杜仲 木鱉子

去殼絲油 沒藥五錢 另研 乳香三錢 另研 破故紙炒五錢 另研

右細末醋糊調藥末敷貼腰上紙蓋綿帛拴住日換

三二次

牛膝酒

一名海桐皮酒
出醫方大成

治腰膝痛不可忍庸醫以腎傷

風毒攻刺服之步履漸重均州刺史王紹顏云余患腰痛不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥莫療因服此劑便減五分步履便輕

牛膝 川芎 羌活 地骨皮 五加皮 薏苡

仁

各一兩

甘草

生地黃

十兩

海桐皮

二兩

右剉散帛裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏七日分數

服旋浸三五宿每服一盃日三四盃長令酒氣不絕
為佳一法加杜仲一兩炒絲斷用之尤妙合時不用
添減禁毒食

木香丸 治腰痛沉重腹肚不能轉動

木香

半兩

檳榔

剉

桂

去麤皮

附子

炮裂去皮臍

革薢

芍藥

去

皮

去

去

去

去

去

去

郁李仁

去皮別研如膏各二錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空

心日午夜卧服微利為効

小七香丸

出危氏方

治鬱怒憂思氣滯腰疼因閃擗撲

甘松

炒十兩

甘草

炒十兩

香附子

炒去毛十五兩

丁香皮

十五兩

蓬莪朮

煨乘熱碎二兩半

縮砂仁

二兩半

益智仁

炒七兩半

右為丸每服五十九橘皮一錢鹽少許煎湯空心服
或用沉香降氣湯打和勻氣散服

治腰痛牽引足膝脚腫痿用如神

出經驗良方

杜仲

薑汁炒去絲

續斷

黑牽牛

破故紙

炒

桃仁

炒去

皮

玄胡索

各等分

右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五七十九
湯酒任下加胡桃肉同丸為妙

治腰疼

穿山甲一錢花錫一錢水銀一錢乳香一錢草麻子七枚
火煨研末

麝香少許

右各研為細末用谷樹漿合成小銅錢大貼之

治氣滯腰痛出經驗良方

陳赤麴焙乾骨碎補薄切去毛大茴香各等分

右為末每服二錢空心熱酒調下

治腰痛不得立方

出千金方

甘遂

桂心

一作附子

杜仲

人參

各二錢

右為末以方寸匕內羊腎中灸令熟服之

治腰疼痛用轉下膿水

黑牽牛

炒

白朮

各一分

桑白皮

一兩

木通

半兩

右為細末每服三錢茶清調下四更時服轉了粥補

寄生散

治腰痛

桑寄生

切炒

牡丹皮

鹿茸

酒浸炙各半兩

桂

去麋皮半兩

右為細末每服二錢溫酒調下空心日午夜卧服

一方

出海上方

治腰痛

金毛狗脊

生鼈甲

醋炙

赤牛膝草根

葉下數根赤紅

長生

不死草

各等分

右咬咀以水同煎服

歲靈仙九

一名定痛九出經驗良方

治氣滯腰疼

歲靈仙

去土半兩

金櫻子

去核一兩剉碎炒焦

舶上茴香

半兩

川烏

炮去皮

臍一兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九
空心溫酒下食前二服為効

治血滲腰痛

用續斷牛膝桃仁炒煎湯磨沉麝丸下

白朮散

出十便
良方

治腰痛陰然以熱物著痛處即少寬此

由久處卑濕復感風邪傷於足太陽之經與血氣相
搏診其脉緩澁並宜服之

白朮

二兩

芍藥

三兩

官桂

一兩

附子

半兩

右為細末每服二錢空心酒調服余居士史載之指

南方嚴州公庫有版

療腰疼痛下膿水

石鹽

一方作食鹽

乾薑

杏仁

去尖

醬餅

各等分

右為末以綿裹導之六七過下膿水腰下疼痛差止

一方無醬餅

牛膝散 療腰腎病膿水并治停水腰痛

牛膝

六分

檳榔仁

十枚

防已

六分

牽牛子

八分

炒

右為散空腹以酒下三錢以宣瀉即差如利三五行即少投醋於下內慎生冷油膩蒜等物後以補腎氣湯九投之可

治腰痛不可忍者

出海上方

芸臺

炒

菴蘭子

橘子仁

各等分

等

右為細末每服二錢酒一盞煎至七分空心熱服

治腰痛單方

出德生堂

官桂 玄胡索 杜仲 去皮炒絲斷等分

右為細末每服三錢空心熱調下

杜仲酒 治腰痛

杜仲 去麁皮 丹參 各八兩 芎藭 五兩

右細剉用酒一斗五升浸五日為滿隨性多少溫飲

當歸丸 出仁存方 治腰痛不可轉側如錐刀所刺大便黑小

便赤澁或黑此血汗滯於腰間謂之血瀝腰痛診其脉弦者是也

當歸

三兩

水蛭

三十個炒去足

桃仁

三十箇去皮尖

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服十五丸漸加至

三十九酒下食前服

速効散

出經驗良方

治男女腰痛不可忍者

川棟子

取肉巴豆五粒去殼同炒赤去巴豆

茴香

各一兩鹽炒熟去鹽

破故紙

炒一兩

右為細末每服一錢熟酒調下

神應散

一名如神湯出家藏經驗方

治腰痛神効亦治閃肭滯牽引

足膝不能行動

玄胡索

一桂心兩

當歸

各半兩

右為末酒調三錢食前服一方用猪腰子一隻批開
摻藥在內濕紙煨熟五更細嚼熱酒下名舒筋散陳
氏經驗方云潭人滕珂云北方得於徽之祈門老醫
真是如神故以名之

葫蘆巴散

葫蘆巴

杜仲

胡椒等分

右為細末每服二錢先嚼胡桃二箇食前酒調服

治腰疼痛

降真香節 檀香節 沉香節

共一兩重

右用煎湯空心服腰便不疼

治腰如神

出德生堂

杜仲

炒去絲

木香

官桂

各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下空心此藥活血化氣

第一品藥也

治腰痛方

胡桃肉

四兩

杜仲

四兩

補骨脂

四兩

右咬咀水煎服

熨法延年療腰痛

菊花

二升

羌花

二升

羊躑躅

二升

右以醋拌令濕潤分為兩劑內二布囊中蒸之如炊一斗米許頃適寒溫隔衣熨之冷即易熨痛處定即

差

出集驗方

治腰疼方

草烏頭

火燒香

五靈脂

右用葱心同搗爛丸如小指面大臨卧涼酒下

治腰痛單方

出百一選方

葳靈仙

橘核

各等分

右為細末熟酒調下一方以猪腰子煮食猪肚亦可

服藥後忌茶飯

兔絲子丸

出百一選方

治腰痛極有驗效兼治腎虛

藏靈仙

兔絲子

酒浸杜仲去皮炒斷
絲各等分

右為細末以山藥糊丸如梧桐子大每服五十九鹽酒或鹽湯下亦得

鹿茸丸

出百一選方

治腰痛

鹿茸

去毛酥炙微黃

附子

炮裂去皮脂

右各二兩鹽花三分同為細末煮棗肉丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒食前下日再服

附牛丸

一名起痛丸
出仁存方

治腰痛亦治閃肭腰痛不可轉側

痛不可忍此由勞役用動傷經絡或因從高墜下氣
滯於足太陽之經留而不得行為正氣衝繫而致傷
痛

附子

半兩
炮

黑牽牛

炒止取
一頭末

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三十九空心
溫酒下半邊痛各半生半熟並去皮一方鹽湯下

立安散

出醫方
大成

治腰痛

杜仲

炒去
絲

臭橘子核

各等
分

右咬咀用好酒浸春秋三日夏二日冬五日空心溫酒令酒熱連藥嚼服或為末麵糊丸梧桐子大溫酒下三十丸空心服日三服一方為末入鹽少許酒調服食前

茸角丸

出千金方

治腰疼單方

無鹿茸用角亦得

鹿角

去上尖取白者熬令黃心中黃不中服

鹿茸

新者良陳者不佳

右為末酒服方寸匕日三服特禁生魚餘不忌一方用鹿角屑熬黃酒服

透骨丸 治男女腰痛腿冷婦人胎冷小腸疼痛不止

針砂

一兩半
兩砂兩

右先將硃砂為細末次後共針砂相和一處用冷水拌勻候少痛時用好夾綿紙重包前藥如熱透於痛冷處熨之用罷就攤藥乾

治腰疼

青木香 乳香

各二錢

右用無灰酒放藥在碗內用酒浸藥於飯甑內蒸得

乳香化溫服之三日即愈

倉卒散 治氣滯腰腹間攣急疼痛不可屈伸腹中冷
重如石痛難忍自汗如洗手足冰冷久不差垂死方

山梔子

四十九箇連皮燒半過

附子

一枚炮去皮臍

右為末每服二錢酒一小盞入鹽少許煎七分溫服
又治胃痞切痛

白蒺藜散

出御藥院方

治腰痛

白蒺藜

右為細末每服三錢溫酒調下空心食前服

皂角膏

出神
効方

右用乾酒三大碗皂角一觔去皮弦搗碎熬至一半
濾去滓再用前汁入石器熬為膏子隨痛處貼之

散滯丸

出衛生
家寶方

治腰痛不可忍者

右牽牛不拘多少碾取頭末去滓不用取大蒜每一
瓣入巴豆肉一粒在內用濕紙裹定煨令蒜熟去巴
豆將蒜研細和牽牛為丸如梧桐子大每服五九醋

茶湯下空心食前量虛實服一方無巴豆硃砂為衣
每服二十九酒下只一服便安

治腰痛單方

出百一選方

用生橘核炒香研入酒去滓下青木香丸

治腰痛不可忍者

出經驗良方

右用破故紙一兩好酒浸一宿去酒入麥麴炒令焦
黃黑去麴為末入杏仁桃仁各半兩並去皮尖爛研
後用浸藥酒拌麵糊為丸如梧桐子每服二十九空

心鹽湯或酒下

治感寒濕與脾氣蔽腰

出海上方

五積散加桃仁煎空心食前服傷臟人不可服五積

散見本類後

神麴酒

出續易簡方

治挫閃着腰痛不能轉側陳久神麴一

大塊燒通紅淬老酒去神麴通口吞青蛾丸兩服頓
愈一方不用青蛾丸服後仰臥片時効再服

治腰痛方風濕轉動不得

出十便良方

用蒴藿葉火燎厚鋪床上趁熱卧眠於上冷復易之
冬月取根舂碎熬及熟準前用并治風濕冷痺及產
婦患傷冷腰痛不得動亦用之

治腰疼氣痛

五靈脂

右為末好酒送下婦人加當歸煎酒調下一二分

薑附湯

出直指方

治體虛傷冷腰痛加官桂製杜仲各五錢

食前服

方見中寒類

敗毒散 治風熱腰痛加續斷天麻薄荷木瓜各等

方見傷寒
陽語類

治腰重疼

出肘
後方

用檳榔為末酒下八錢或五錢

治腰痛

出外臺
秘要方

取黃狗皮炙裏痛腰處取煖徹為度頻即差也

治反腰有血痛方

出肘
後方

用搗杜仲三升許以苦酒和塗痛上乾復塗并灸足

踵白肉際三壯

杜仲酒方 治腰背痛

用杜仲半觔去皮酒二升浸七日每日三度服之甚妙宋明帝宮人患腰痛牽心發則氣絕徐文白視之曰髮瘕以油灌之吐物如髮引長二尺頭已成蛇能動搖懸之滴唯一髮病即瘥

出風科
集驗方

治腰痛

用皺面草研細好酒調下即愈

治一切腰痛

以安胎飲下保生丸青蛾丸亦妙一方以炒鹽下

又方以菴藺紅麴搗爛好熱酒調下

又方以紅麴末熱酒服

又方

出直指方

以茴香根同紅麴搗爛好熱酒調服妙一方只用茴

香根搗爛好酒調下立愈雪溪傳甚妙一方用八角

茴香炒末食前溫酒調下

又方

以蒼朮紙裹入小火內煨過待冷刮去皮為末每服三錢酒一盞調服之

療腰痛大豆方

出聖惠方

用大豆六升拌令溫炒令熱以布裹隔一重衣熨痛處令煖氣徹冷即易之切須避風仍取白楊皮濃煎汁洗濯之甚佳

治氣滯腰痛

出直指方

用人參順氣散烏藥順氣散加五加皮入少甘草煎

湯調下或用木香流飲立効

方見風門風類氣門氣類

安腎丸 治腎虛腰疼橘皮鹽煎湯吞加草薢尤佳

獨活續斷湯 療腰痛皆氣虛弱卧冷濕地當風所得

不時差久久流脚膝冷痺疼弱重滯或偏枯腰脚疼

攣脚重急痛

獨活

三續斷

兩杜仲

二桂心

二防風

二芍藥

三牛

膝

二細辛

二秦艽

三茯苓

二人參

二當歸

二芍藥

藥

二兩
白者 乾地黄 甘草 各三兩 灸

右以水一斗煮取三升分三服溫服將息勿取冷用
蒴藿葉火燎厚安床上及熱卧上冷即易之冬月取
根搗用亦須熬之忌蕪荑生葱生菜海藻松菜酢物
肘後有附子無續斷甘草牛膝人參當歸止十二味
神仙磨腰丹 駱冲虛傳頭丹腰下如火二丹知血脉
流通三丹骨髓盈實十丹永無非橫之患修合之時
宜於淨室中切忌婦人鷄犬見婦人不生子者十丹

則血臟煖成胎孕

附子

炮去皮

白礬

燒灰

丁香

研

硃砂

研

硫黃

研

陳皮

去白

乾薑

炮為末

吳茱萸

為末

杏仁

去皮尖

木香

為末

麝香

一錢

別研

膩粉

一錢別研

右除麝香膩粉各淨秤一兩為末併入乳鉢內為末
粉麝一處研入極細蜜為丹如中指大每一丹丸用
生薑秤七錢取自然汁於銀石器煎五沸傾於盞內
投藥良久以手指研極細勿令有砂用手蘸磨腰間透

巡如火熱以盡為度便將軟熟裹壯上下繫定隔日
不須解善療男子婦人水臟久虛五勞七傷衰弱鬢
髮早白腰膝疼痛婦人水臟久虛血散子宮耳聾目
暗穢惡之病風勞等證並治之

療男子患腰腎疼痛髀膝有風冷耳鳴食飲無味并有
冷氣方

乾地黄

四兩

茯苓

三兩

白朮

二兩

澤瀉

三兩

山茱萸

三兩

茯苓

二兩五味子

三兩

桂心

二兩

石斛

二兩

巴戟天

三兩

防風

二兩

人

參二磁石

兩二兩
研

右為末蜜丸如梧桐子大酒下二十九日再忌桃李

雀肉生葱酢物蕪荑

治腎虛氣衰腰脊痛疼或當風卧濕冷入頭中不速治
流入腿膝為偏枯冷痺緩弱宜速治之方

出肘後方

獨活分四附子

一枚大者炮

杜仲 茯苓 桂心

各八分牛

膝 秦朮 防風 芎藭 芍藥

各六分

細辛 乾

地黃

十分切

右水九升煎取三升空腹分三服如人行八九里進

一服忌如前項服三劑

三至九

出澹療方

治老人虛弱人腎氣虛損腰痛不可屈伸

鹿角

鎊三兩

麋角

鎊二兩

附子

炮去皮臍

桂心

不見火

補骨脂

炒各一兩杜仲

去皮剉炒斷絲一兩

鹿茸

酒蒸焙一兩

青鹽

另研半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九空心用胡
桃肉細嚼以鹽酒鹽湯任下惡熱藥去附子加肉蓯
蓉一兩酒浸微炙乾用

療腰痛少氣陰弱寒冷小便清冷瀝滴陰下濕癢少腹
急無子息方

甘草

十分

續斷

三分

麥門冬

三分

薯蕷

三分

附子

三分

乾

薑

三分 棘刺

四分

右為末酒服方寸匕日三忌猪肉冷水海藻松菜必

効一方無乾薑

木瓜丸

出御藥院方

治腰痛補益壯筋骨

牛膝

二兩溫酒浸切焙

木瓜

一枚去頂穰入艾葉一兩蒸熟

巴戟

去心

茴香

炒
木香各一兩桂心半兩
去皮

右為細末入熟木瓜并艾同杵千下如硬更下蜜九
如梧桐子大每服二十九空心鹽湯下

腎氣九 主短氣腰痛身重調中補筋脉不足方

乾地黄 續斷 人參各五分 草薢 阿膠各三分

右為末蜜和丸如梧桐子大每以酒下十九加至二
十九日再服忌蕪荑生冷

杜仲丸出千金方補方

杜仲一石斛

兩分

乾薑

乾地黄

各三分

右為末蜜丸如梧桐子大每服二十九日再酒送下

革解散

出千金方

治腎虛腰痛

革解

桂心

白朮

各三分

牡丹皮

三分

右為末酒服方寸匕日三亦可作湯服之甚良一方

入鹽少許

杜仲散

出德生堂

治腎虛腰疼痛俛仰愒愒短氣此由腎氣

虛弱勞傷過度

杜仲

一兩去皮杵令爛以名酒浸一宿焙乾

肉桂

牡丹皮

各半兩

右為細末每服二錢溫酒下

治腎虛腰痛方

出聖惠方

附子

二錢分

桂心 牡丹皮

各一兩

右為末酒服一方無桂亦驗

寄生散 療氣腎腰痛

桑寄生

鹿茸

杜仲

各一分

右為散酒服方寸匕日三服

青蛾丸

出醫方大成

治腎氣腰痛益精助陽烏鬚髮去風濕

脚氣常服壯筋補虛

破故紙

四兩炒香杜仲去麤皮剉四兩用

右為細末用胡桃肉三十箇研膏入少熟蜜丸梧子

大每服五十九每日常服食前下

青蛾丸

出如宜方

治腎虛勞力腰疼益精助陽烏鬚健脚神

効

破故紙

四兩炒香杜仲去麤皮切薑汁拌炒去絲八兩

右為末用胡桃肉五十枚大蒜二十箇研膏如梧桐

子大每服三十五丸鹽湯服虛極人十補湯吞服一

方加川續斷桃仁去皮尖玄胡索黑牽牛炒酌量入

十補湯

方見虛勞門虛損類

鹿茸丸

出百一選方

治腎氣虛弱腰痛

鹿茸

三兩切作片子酥炙黃

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九鹽湯

下食後

治脇下痛

用葱白煎湯調滑胎枳殼散服

方見婦人門滑胎類

摩腰膏

治老壯一切腰痛痼冷腿脚寒濕此治之大

壯筋骨助元陽極有補益用之自見

陳皮

去白一兩

陽起石

五錢

沉香

官桂

去皮

舶

上硫黃

吳茱萸

雄黃

蛇床子

以上各五錢

枯白

礬

一兩杏仁皮

去夫

輕粉

一錢麝香

半

附子

一個須一兩者

炮去

母丁香

一兩

硃砂

一錢二分

右除輕粉朱砂麝香另研外餘藥併為細末後入上
三味和勻煉蜜丸如彈子大臨用時取生薑自然汁
煎濃後入藥一九良久浸化研之令人手蘸藥塗於
腰腹上摩之以盡為度須用綿裹肚裹腰上其熱如
火每日一次用之極有奇功

薏苡仁丸

出醫方大成

治腰脇疼痛手足枯痺

薏苡仁

一兩

石斛

用細者七錢半

附子

半兩

牛膝

桃仁

各一分

作椒仁

生乾地黄

各二分

細辛

人參

甘草

栝子

仁 枳殼 川芎 當歸

各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九酒吞下空

心日三服

芎藭湯

出本事方

治脇下疼痛不可忍者

桂枝 川芎 細辛 乾葛 防風

各半兩

芍藥

枳殼 麻黃 人參 甘草

各一分

右㕮咀每服五錢水一盞薑三片煎七分溫服

枳實散

出醫方大成

治兩脇疼痛肝氣不足

枳實

錢一

白芍藥

川芎

各一兩

人參

各半兩

右為末空心薑棗湯調服二錢酒亦可一方薑鹽湯服

推氣散

出危氏方

治右脇疼痛腹滿不下食

枳殼

炒半兩

桂

片薑

各半分

甘草

三錢

右為末每服二錢薑棗湯調酒亦可不拘時

枳芍散

出醫方大成

治左脇刺痛不可忍

枳實

炒

川芎

半兩

甘草

二錢半

右為末每服二錢薑棗湯下不拘時酒調亦可

治一切走疰疼痛氣攻腰脚攣急者

出經驗濟世方

黑五虎脂 大香附子

各等分

右為末醋糊丸蠶豆大每服十二丸丈夫鹽湯婦人醋湯下

桃仁酒

出經驗良方

治腎虛風勞傷腫牽引小腹連腰痛

用桃仁一味麩炒去皮尖研細每服四錢熱酒調下得汗愈

順氣丸

出如宜方

治腰膝無力大腸閉則痛發膝下似水冷

大黃

五兩半生半熟

車前子

檳榔

麻仁

炒

牛膝

酒浸

郁

李仁

湯去皮

兔絲子

酒浸蒸

山藥

山茱萸

防風

枳殼

獨活

各二兩

右為末蜜丸如梧桐子大茶酒米湯任下此藥補益

通利疏風順氣

又方

出海上方

治腰痛及遍身酸疼者

金橘子仁

炒令黃色去殼為末

每服三錢溫酒調下不拘時服

治腰脊善痛不遂方

出千金方

用大豆三升熬一斗水煮蒸一斗酒以六斗甕一口蒸令極熟蒸豆亦熟內甕中封閉口秋冬二七日於甕中作孔出取服五合日夜二三服見効一方用生大豆二升酒三升煮取二升頓服佳

又方

出千金方

用地黃花為末酒服方寸匕日三

又方

出千金方

用三月三日收桃花取一斗一升并花水三斗麴六升依數用之同入米六斗炊之一時釀熟去糟每服一升日三服若作食飲用河水

治急引腰脊痛

出本草

用蒺藜子為末蜜和丸酒服如胡豆大二九日三服封臍艾治腰膝痛臍腹冷痛老人弱婦人小兒泄瀉并宜用之每日熨烙為効

海艾 蛇床子

各半兩

木鼈子

二對生
用去殼

右為細末與艾三味相和勻作一紙圈於內可以容
熨斗將藥可用綿包裹定安在紙圈內在於臍上用
熨斗熨之

治腰臍坎痛

用猪腎一對研著胡椒橘皮鹽醬椒末等搜麵似常
法作餛飩熟煮空腹與兩碗差

專治腰痛方

阿魏 乳香 菖蒲 達達茴香 各五錢 乾薑 五錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服六十九好酒空心送下熟雞蛋壓之便食飲忌醋

治腰痛方

出海上方方見風濕腰痛類草解酒方

治腰痛神妙

出本草

用破故紙為末溫酒下三錢

治積年久病腰痛有時發動脇疼如打

出肘後方

六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服

二香五子三茱九

出永類
鈴方

治腰痛

青木香

兩半

大腹子

兩

川棟子肉

兩三

香附子

兩炒

一羅

茴子

炒兩

二

黑牽牛

生三兩半

熟八角茴香

半兩炒

吳茱

萸

食茱萸

山茱萸

去核各
三兩

右為末酒糊丸空心溫酒鹽湯下

補髓膏

出衛生
家寶方

治腰痛

破故紙

一兩

錫內炒

令八分

熟再入

麻油半兩同炒

麻油香為度

右放冷入胡桃肉同煎藥并油麻爛嚼鹽酒或鹽湯

送下

五加皮散

出衛生家寶方

治腰疼

五加皮

杜仲

炒

右等分為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒

下

內補散

出衛生家寶方

治遠年近日腰疼丈夫婦人腎臟久虛

腰疼不可忍者

青皮

去穢秤

破故紙

炒

葳靈仙

去蘆洗焙以上三味各一兩

黑牽

牛三兩

右為細末每服二錢溫酒調下空心食前

川烏丸

出朱氏集驗方

治男女腰脚滯重

川烏 當歸 杜仲 骨碎補 五靈脂

右等分酒糊為丸空心酒下

牽牛散

出朱氏集驗方

治腰痛神妙

黑牽牛

不拘多少攤熟瓦上勻鋪不可撥動蓋欲半生半熟

右為末酒調加茴香尤佳

又方

出朱氏集驗方

治風腰痛最妙

小續命湯加桃仁七粒炒去皮尖煎服

川芎肉桂湯

出誠効方

治腰痛丁未冬曹通甫自河南來有

役夫小翟靈君卧寒濕地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛已經月餘不愈矣腰痛論中說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二證屬少陽膽經外絡脉病皆去血絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得用針只用服藥通其經絡破其血絡敗血

羌活

一錢半

獨活

半錢

柴胡

肉桂

桃仁

去皮尖研

當歸

尾蒼朮

甘草

炙各一錢

炒麴

半錢

防風

三錢

漢防已

酒製三分

川芎

三分

一方無川芎

右咬咀作一服好酒三盞煎一盞去滓溫服早飯前數服良愈宜溫煖處服之

羌活湯

一名暖筋湯出試効方

治兩目如火腫痛兩足如伏兔骨

筋疼痛膝胫少力身重腰疼夜惡寒痰嗽項筋皆急目外眇目系急食不下

羌活

三錢

麻黃

三分

甘草

二分炙

生甘草

二分

升麻

黃皮

酒製

草豆蔻

當歸

黃芩

各三分

柴胡

二分

生地黃

三分

藁本

三分

蘇木

二分

熟地黃

一分

蒼朮

半分

獨活

二分

右件

咀咀

如麻豆大

都作

一服水

二大盞

煎至

一盞

去

滓

稍熱

每食

遠服

地龍散

出試効方

治腰脊痛

或打撲傷損

從高墜下

惡血在

太陽經中

令人腰脊

或脛膕臂中

痛不可忍

鼻壅塞

不通

官桂

分四桃仁六個

羌活

分二獨活一錢

黃蘗

一錢

麻黃

半錢當

歸尾

地龍

分四

甘草

一錢蘇木六分

右件咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

剋効餅子

出衛生寶鑑方

治腰疼及腓膝累得神効

甘遂

一兩麩炒黃色

黑牽牛

揀淨四兩半生半熟頭末二兩半

蕎麥

麵一兩

右三味為末每服三錢夜卧滴水成餅子熨火燒

黃色取出氣實者作一服爛嚼後煎半生半熟葱白

酒送下如氣虛作兩服先嚼一多半葱白酒送下至

明取動又嚼一半生一半熟葱白酒送下取利一行
婦人有胎不可服

仙靈丸

出余居士選奇方

治遠年近日腰痛

葳靈仙 沒藥 乳香 玄胡索 黑牽牛 破

故紙

各一分炒黃

陳皮 三分 巴豆

一粒去殼入蒜肉紙包慢火煨熟去巴豆用蒜

右用前件為末酒煮糊丸如梧桐子大每服三九五

更初茶清送下

蒼朮湯

出試効方

治濕熱腰腿疼痛

蒼朮

三錢去濕上痛

柴胡

二錢行經

黃蘗

一錢始得之時寒也久不愈寒化為熱除

濕止

防風

一錢風勝濕

右件作一服水二盞去滓稍熱服空心食前一服無

防風

麻黃蒼朮湯

出試効方

治濕寒頭容身體沉重腰痛面色痿

黃不澤

麻黃

一錢桂枝

半錢杏仁

十箇

草豆蔻

半錢

半夏

半錢

炒麴

一錢

蒼朮

二錢橘皮

一錢

澤瀉

一錢

白茯苓

一錢

猪苓

半錢

黃耆

三分

炙甘草

分二

右件咬咀如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓

稍熱服食前

烏藥順氣散

出如宜方

治氣滯腰疼或俛仰趑閃

白殭蠶

製

川芎

白芷

枳殼

桔梗

甘草

灸各

錢一麻黃

製

陳皮

製

右為末加薑酒煎或頭痛加葱白煎又宜炒桃仁溫酒服

五積散

出如宜方

治寒濕傷脾氣滯腰疼不可俛仰

陳皮

製六兩

甘草

炙

茯苓

半夏

製

肉桂

麻黃

三兩

枳殼

六兩

白芍藥

川芎

白芷

厚朴

乾薑

各四兩

兩桔梗

十二兩

蒼朮

製二十兩

右咬咀慢火炒令色轉續入肉桂枳殼薑蔥加桃仁

煎

固真丹

出如宜方

治寒濕及腎氣

蒼朮

一觔米泔浸逐日換春五日夏三日秋七日冬十日漉出切作片子焙乾分為四處

兩

好醋酒各半升一處煮三十沸出焙乾

四兩

用茴香一兩鹽一兩同炒朮黃為度

四

兩川椒去目并合者一兩破四兩川烏一兩製去皮臍作片子川

棟一兩去皮核劈開炒黃為度

右共為末煮藥酒打糊丸如梧桐子大每服三十丸

溫酒鹽湯下

補腎湯

出本草

治主腰痛

以杜仲一大觔五味子半大升二物細切分十四劑
每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一濾
取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如法作羹

空腹頓服用鹽酢和之亦得一方不用五味子

治腰痛腎冷

出本草

用芥子和生薑研微暖塗貼

王方平通靈玉粉散 治腰膝煖水臟益顏色其功不

可具載

硫黃

半觔

右用桑柴灰五斗淋取汁煮三伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大火鍛之如未更煮以伏

為度鍛了研為散穿地坑一尺二寸投水於中待水清取水 and 硫黃末水不得多於鍋中煎熬令如膏又用鐵鍋一面不著火止以細砂隔紙慢炒將硫黃於紙上滴之自然如玉色光彩射人此號為玉粉散細研要丸以飴丸如麻子大空心每日鹽湯下十九散服亦鹽湯調兩匙極有效驗余鄉人王昭遂合服之年九十顏貌如童夜讀字倍常人

法

導引法

凡學將息人先須正坐並膝頭足初坐先足指相對
足跟外於坐上少欲安穩須兩足跟向內相對坐上
足指外入覺悶痛漸漸舉身似軟便坐足上待其內
坐相似不痛始雙立足跟向上坐上足指並及向外
每坐常學去膀內冷風膝冷足疼上氣腰疼盡自消
適

又法


出危氏方

治腰腎痛

正東坐手抱心一人於前據蹠其兩膝一人後捧其頭徐牽令偃卧頭倒地三起三卧便瘥

一法 治男子婦人腰痛不可忍者

用左右帶研索於朝太陽長伸卧地以紙研如左用右研入鼻中如右用左以涕為驗便安適即起行步



普濟方卷一百五十四